Sauvignon blanc chimère

Vass2R11s381-385

0Mtp1037



FINA Collection Vassal-Montpellier


3557

0Mtp1037

Sauvignon blanc chimère

Vass2R11s381-385

LP 22/07 X6





#### Formulaire de description 2/8 (floraison)

Année : 2005 Code cépage :

Code introduction Nom introduction: Sauvignen blanc Chamère Observateur : SL

Emplacement: 2 Rus 381\_385

#### Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7)

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1 - en liser (2)- partout 3

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7)- très forte 9 oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 7 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

#### Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7- très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenné 5)- forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

# Vassal:

#### Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203) - très forte 204. Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup.: blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée : .....)

# Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225. Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282) - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 -

très forte 219

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233

#### Formulaire de description 3/8 (floraison)

Année: 2005 Code cépage :

Code introduction

Nom introduction: Saurignon blanc

Observateur : SL

Emplacement: 2 RM1881285

# Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9. oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1. - faible 3 - moyenne 5- forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3 oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte 1)- verte à raies rouges 2 - rouge 3. oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence présence 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible(1)- moyenne 5 - forte 9.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) 1- subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles : très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

#### Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3) femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud 1)- au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau : 1 ou moins(1)- 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4 oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 - présence 9

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%)(3)moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

# Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2.)

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2, - ou coma (3)

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 - rouge clair 2 - rouge foncé 3 - vert(4)

Bouton floral: petit 1 - moyen(2)- gros 3.

# Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison) Année: 200 4 Observateur: Code cépage : O Code introduction: 1037 Nom introduction: Saurignon blanc dinine Emplacement: 2811 3381-385 Feuille adulte oiv 065 taille : très petite 1 - petite 32- moyenne 5 - grande 7 - très grande 9. oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme D - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5. oiv 068 nombre de lobes : seuille entière 1 - trois cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5. oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3- vert moyen 5 vert foncé 7. Ta de Vert Sair oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4 oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 2- point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. oiv 074 profil : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente D- présente 9. oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente ? - présente 9. oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure nulle ou très faible 1 - faible 3- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 9 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absented - présente 9. oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente P- présente 9.

## Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible ? - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9. [ sinus pétiolaire : ouverture = 0-2-3-4-5-6 / forme = U-accol. -V / dent = oui-non / dégarni non-parfois-oui ]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

#### Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré(2)- coloré 1